

ODONTOLOGIA

PADRÃO DE RESPOSTA

Questão Discursiva 3

O estudante deverá indicar 4 dentre as informações a seguir.

- Caracterização da área geográfica;
- Cadastramento das famílias;
- Situação epidemiológica de saúde bucal da população adscrita;
- Serviços de saúde existentes na área;
- Estabelecimentos de ensino e ambientes comunitários;
- Infra-estrutura disponível.

Questão Discursiva 4

a) Tratamento indicado: Pulpectomia ou Necropulpectomia

b) Etapas:

- Anestesia infiltrativa local;
- Isolamento do campo operatório;
- Tratamento endodôntico incluindo obturação da câmara pulpar / canais com pasta reabsorvível;
- Restauração do dente com amálgama, resina composta ou coroa de aço;
- Acompanhamento.

Questão Discursiva 5

- Raspagem supragengival, polimento coronário e instrução de higiene oral;
- Remoção de tecido cariado e selamento provisório da cavidade;
- Cirurgia para recuperação da distância biológica periodontal com osteotomia;
- Restauração direta com resina composta do elemento 36.

ou

- Raspagem supragengival, polimento coronário e instrução de higiene oral;
- Remoção de tecido cariado e selamento provisório da cavidade;
- Cirurgia para recuperação da distância biológica periodontal com osteotomia;
- Restauração direta com amálgama do elemento 36.

ou

- Raspagem supragengival, polimento coronário e instrução de higiene oral;
- Remoção de tecido cariado e provisório;
- Cirurgia para recuperação da distância biológica periodontal com osteotomia;
- Restauração indireta do elemento 36.

Questão Discursiva 6

a) O estudante deverá citar 4 fatores dentre os relacionados a seguir.

- Válvulas cardíacas protéticas;
- Endocardite bacteriana prévia;
- Doença cardíaca cianótica congênita complexa;
- Circulação cárdio-pulmonar construída cirurgicamente;
- Malformações cardíacas congênitas;
- Disfunção valvular adquirida;
- Cardiomiopatia hipertrófica;
- Prolapso da válvula mitral com regurgitação.

b) O regime antibiótico profilático para procedimentos odontológicos é:

- Cloridrato de Clindamicina / Clindamicina 600 mg via oral/ 1 hora antes do procedimento;

ou

- Azitromicina dihidratada / Azitromicina 500mg via oral/ 1 hora antes do procedimento;

ou

- Claritromicina 500 mg via oral/ 1 hora antes do procedimento;

ou

- Cefalexina 2 g via oral/ 1 hora antes do procedimento;

ou

- Cefadroxil 2 g via oral/ 1 hora antes do procedimento).