



Portfólio de
PESQUISAS
Faculdade Florence



APRESENTAÇÃO

A pesquisa científica é considerada o segundo pilar da vida universitária e almeja o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura e promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos.

Na Faculdade Florence a pesquisa científica é incentivada por meio da publicação anual de edital de iniciação científica. A iniciação científica tem por finalidade qualificar e estimular a participação de estudantes no desenvolvimento de pesquisa científica, com o objetivo de criar um pensamento científico, com apoio de um professor pesquisador, bem como despertar vocação para os campos das ciências.

Os projetos de pesquisa submetidos ao edital de iniciação científica da Faculdade Florence devem estar incluídos nas seguintes linhas de pesquisas institucionais: Biotecnologias aplicadas à saúde humana e animal; Biotecnologia aplicada ao estudo de produtos naturais e sintéticos; Direito, educação e cultura; Empreendedorismo, gestão, tecnologia e inovação; Epidemiologia e saúde Coletiva; Saúde e bem-estar.

Mediante a participação em projetos de pesquisa, o acadêmico da Faculdade Florence amadurece o domínio do método científico, promovendo assim o interesse pela pesquisa no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação, visando assegurar o contínuo desenvolvimento da capacidade instalada no Estado do Maranhão.

Este portfólio apresenta os projetos de iniciação científica desenvolvidos pela Faculdade Florence por meio da iniciação científica nos anos de 2022 e 2023. O fortalecimento da pesquisa representa mais um indicador do desenvolvimento e do crescimento da Faculdade Florence, dedicada em desenvolver a pesquisa, um dos pilares principais da Educação Superior.

Como instituição, saudamos com muita admiração nossos pesquisadores docentes e discentes, por toda dedicação e desempenho ao longo da jornada científica. Fazer pesquisa é um ato nobre!

Eduarda Gomes Bogéa

Nutricionista, Doutora em Saúde Coletiva pela UFMA
Coordenadora de Pesquisa e Extensão

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ANESTÉSICA DA ARTICAÍNA E MÉTODO SEM AGULHA (COMFORT-IN) EM PACIENTES COM PULPITE IRREVERSÍVEL: ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO

Projeto de pesquisa aprovado no EDITAL 03/2022 – NUPES

Curso: Odontologia


Professora coordenadora: Cláudia de Castro Rizzi Maia

Aluno : Matheus Filype Frota Rodrigues

RESUMO

A associação da articaína com um sistema anestésico a jato pode ser vantajoso, uma vez que pode permitir o depósito do anestésico em uma fração de segundo, e, com isso, uma maior taxa de difusão, proporcionando alta concentração anestésica de uma vez. Objetivou-se avaliar a capacidade anestésica da articaína associada ao método sem agulha (Comfort-in) em pacientes com pulpíte irreversível sintomática são escassas. O estudo é um ensaio clínico randomizado cego paralelo. Os pacientes são atendidos por um só operador na clínica escola de uma faculdade privada. As atividades foram realizadas nos meses de maio e junho. Foram triados 38 pacientes com 42 dentes e selecionados para pesquisa 12 dentes de 9 pacientes. A análise da condição pulpar do dente que recebe o tratamento de urgência odontológica foi realizada previamente com o Teste de Sensibilidade Pulpar à Frio (TSF) e com o Teste Pulpar Elétrico (TPE), e sob isolamento relativo. Primeiro foi realizado o TPE e, alguns minutos depois, o TSF. Todas as análises foram conduzidas pela mesma operadora que realiza o atendimento de urgência odontológica. Foram avaliados 166 dentes, dos quais 104 foram excluídos. Ao todo, 62 dentes foram randomizados, sendo alocados 31 dentes para o grupo Convencional e 31 dentes para o grupo Comfort-In. Dos 31 dentes alocados no grupo Convencional, 25 dentes foram considerados como anestésias efetivas e 6 dentes foram considerados como não efetivas. Dos 31 dentes alocados no grupo Comfort-In, 22 dentes foram considerados como efetivas e 9 dentes foram considerados como não efetivas. Foram considerados como sucesso clínico os dentes que não necessitaram de complementação anestésica, enquanto que os dentes tidos como anestésias não efetivas foram os dentes que necessitaram que qualquer quantidade extra anestésica além de 1,8ml (1 tubete). Foi observada diferença estatística durante a comparação intragrupo entre todos os tempos de avaliação para todos os grupos de dentes alocados no grupo Convencional. Foi observada diferença estatística durante a comparação intragrupo entre todos os tempos de avaliação para os grupos de dentes molar superior e pré-molar superior alocados na anestesia Comfort-In, enquanto que o grupo pré-molar inferior não apresentou diferença estatística.

Palavras-chave: Odontologia. Anestesia. Articaína.



AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM, TEOR DE PROTEÍNA E GRAU DE HIDRÓLISE DE SUPLEMENTOS PROTEICOS NACIONAIS À BASE DE WHEY PROTEIN

Projeto de pesquisa aprovado no EDITAL 03/2022 – NUPES

Professora coordenadora: Profa. Dra. Eduarda Gomes Bogea

Professora auxiliar: Profa. Sâmara Letícia Lima

Aluna bolsista: Letícia Eveny Moraes Teixeira

Egressa envolvida: Gleyzangela Muniz Gomes

RESUMO

O aumento do consumo de suplementos alimentares é perceptível, principalmente os produtos à base de proteína. Dentre eles, destaca-se o Whey protein, uma proteína extraída do soro do leite, disponibilizada no mercado por diversas marcas com características distintas. A rotulagem adequada desses suplementos é direito do consumidor e otimiza a sua escolha. Objetiva-se analisar a rotulagem de suplementos proteicos nacionais à base de Whey protein. Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo e exploratório, envolvendo avaliação de rotulagem de diferentes marcas de Whey Protein. A amostra do estudo foi composta por 6 marcas de suplementos proteicos do tipo Whey Protein Blend, tendo como única fonte proteica o soro do leite, disponíveis no mercado nacional. Foi elaborado um checklist no programa Microsoft Excel de acordo com os itens da legislação vigente. Foram identificados dois tipos de materiais referente as embalagens dos produtos analisados, o polietileno de alta densidade e o polietileno tereftalato. Todas as marcas apresentaram



medidor e modo de preparo. Diferenciaram-se quanto a quantidade de proteína ofertada por dose. Dentre as marcas avaliadas, 83,33% apresentam pelo menos um tipo de não conformidade, com destaque para a RDC nº 18 de 2010 que apresentou maior número de inadequações. Os resultados apontam para a necessidade de fiscalização contínua dos rótulos, principalmente quanto às especificações obrigatórias das legislações vigentes. Destaca-se a necessidade e intensificação de fiscalização contínua e eficaz dos rótulos dos produtos, para garantir aos consumidores, acesso as informações fidedignas e ajudar nas suas escolhas no momento da compra.

Palavras-chave: Suplementos Nutricionais. Proteínas do Soro do Leite. Rotulagem de Alimentos.



Research, Society and Development, v. 12, n. 8, e13112842969, 2023
(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3459 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12n8.42969>

Avaliação da rotulagem de suplementos nacionais tipo *Whey Protein*

Evaluation of the labeling of national in Whey Protein supplements

Evaluación del etiquetado de suplementos nacionales de Proteína de Suero

Revista: 09/08/2023 | Periódico: 29/08/2023 | Arquivo: 22/08/2023 | Publicado: 25/08/2023

Gleyzangela Muniz Gomes

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3403-9241>

Faculdade Florence, Brazil

gmuniz@florence.edu.br

Dionisey Andrade de Souza

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3403-9241>

Universidade Federal do Maranhão, Brazil

dionisey@ufma.edu.br

Sâmara Letícia Silva de Lima

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3403-9241>

Faculdade Florence, Brazil

samara@florence.edu.br

Eduarda Gomes Bogea

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3403-9241>

Faculdade Florence, Brazil

eduarda@florence.edu.br

Resumo

O aumento do consumo de suplementos alimentares é perceptível, principalmente os produtos à base de proteína. Dentre eles, destaca-se o Whey Protein, uma proteína extraída do soro do leite, disponibilizada no mercado por diversas marcas com características distintas. A rotulagem adequada desses suplementos é direito do consumidor e otimiza a sua escolha. Objetiva-se analisar a rotulagem de suplementos proteicos nacionais à base de Whey Protein. Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo e exploratório, envolvendo avaliação de rotulagem de diferentes marcas de Whey Protein. A amostra do estudo foi composta por 6 marcas de suplementos proteicos do tipo Whey Protein Blend, tendo como única fonte proteica o soro do leite, disponíveis no mercado nacional. Foi elaborado um checklist no programa Microsoft Excel de acordo com os itens da legislação vigente. Foram identificados dois tipos de materiais referente as embalagens dos produtos analisados, o polietileno de alta densidade e o polietileno tereftalato. Todas as marcas apresentaram medidor e modo de preparo. Diferenciaram-se quanto a quantidade de proteína ofertada por dose. Dentre as marcas avaliadas, 83,33% apresentam pelo menos um tipo de não conformidade, com destaque para a RDC nº 18 de 2010 que apresentou maior número de inadequações. Os resultados apontam para a necessidade de fiscalização contínua dos rótulos, principalmente quanto às especificações obrigatórias das legislações vigentes. Destaca-se a necessidade e intensificação de fiscalização contínua e eficaz dos rótulos dos produtos, para garantir aos consumidores, acesso as informações fidedignas e ajudar nas suas escolhas no momento da compra.



ADESÃO MEDICAMENTOSA E NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS IDOSOS SOBRE POLIFARMÁCIA

Projeto de pesquisa aprovado no EDITAL 03/2022 – NUPES

Curso: Enfermagem

Professora coordenadora: Eduarda Gomes Bogea

Alunos: Thaylane Barbosa Martins (bolsista de iniciação científica) e Hosana Lopes Pinheiro Tinoco

RESUMO

A polifarmácia é definida como uso rotineiro de 4 ou mais medicamentos concomitantemente pelo mesmo paciente, prescritos ou isentos de prescrição médica. O uso da polifarmácia leva a maior suscetibilidade a síndromes geriátricas nos idosos e a ação dos medicamentos diverge da apresentada em adultos mais jovens, causando alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Objetivou-se avaliar a utilização indevida de medicamentos e o conhecimento de idosos em relação a polifarmácia. Foi realizada uma pesquisa de campo descritiva exploratória, com análise quantitativa, com idosos atendidos em Unidades Básicas de Miranda do Norte. As variáveis obtidas se dividem em dados sociodemográficos, utilização da medicação e polifarmácia. Os dados foram armazenados no programa Excel® e as análises estatísticas no programa STATA®. Dos 66 idosos que participaram do estudo 53,58% eram do sexo feminino e 42,2% masculino. A média de idade observada foi de $69,6 \pm 6,4$ anos. Dos idosos 93,44% compreendem a razão de suas prescrições, 45,45% sabem o nome dos seus medicamentos, 25,76% já deixaram de utilizar o medicamento porque não queriam tomar. Idosos que sabem o horário da medicação 87,88%, utilizam conforme prescrição 81,82%, ainda destes 69,70% utilizam medicamentos sem prescrição médica. As patologias mais prevalentes nos idosos foram hipertensão arterial e diabetes mellitus. No momento da consulta 25,76% saem com dúvidas da consulta. A prevalência de polifarmácia foi de 48,48%, ainda 68,18% consideram que utilizar muitos medicamentos leva prejuízos à saúde. É importante alertar sobre o consumo inadequado e sem prescrição, podem agravar seu estado de saúde e levar até à morte.

Palavras-chave: Polimedicação; Conhecimento do paciente sobre medicação; Adesão a medicação.



AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO TEOR DE IODO EM AMOSTRAS DE SAL E SUA RELAÇÃO COM O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE IODO EM NUTRIZES E LACTENTES DE SÃO LUÍS, MA

Projeto de pesquisa aprovado no EDITAL 03/2022 – NUPES

Curso: Biomedicina e Farmácia

Professora coordenadora: Wyllyane Rayana Chaves Carvalho

Alunos: Camile Kauane Amorim Muniz (bolsista de iniciação científica), Bruno Costa Vaz, Isamara Carvalho Lima e Ariana Santos Leão

RESUMO

É crucial que estudos epidemiológicos investiguem a associação entre a adequação do iodo do sal de cozinha e o atendimento nutricional desse micronutriente em nutrizes e lactentes, público minimamente estudado diante dessa temática. Portanto, o presente estudo tem por objetivo avaliar a adequação do teor de iodo em amostras de sal e sua relação com o atendimento das necessidades nutricionais de iodo em nutrizes e lactentes de São Luís, MA. A amostra probabilista pertence a uma pesquisa maior, multicêntrica (projeto guarda-chuva), realizada em todas regiões do país, com indivíduos avaliados em Unidades Básicas de Saúde ou em domicílios. No entanto, foram utilizados os dados exclusivamente de São Luís, MA, que correspondem a 436 nutrizes e lactentes. O iodo do sal foi analisado seguindo métodos científicos referenciados, bem como o iodo urinário das nutrizes e lactentes. Outras variáveis de interesse também foram analisadas: as socioeconômicas e demográficas e perfil de saúde. Os resultados serão descritos por meio de médias, medianas, desvio padrão ou percentuais. A normalidade foi testada, em seguida testes paramétricos ou não paramétricos serão realizados para testar a relação entre adequação de iodo e atendimento nutricional do mesmo em nutrizes e lactentes. Foi utilizado o programa STATA versão 14.0. Os resultados encontrados poderão demonstrar a adequação das amostras analisadas e se há relação com o atendimento nutricional do iodo.

Palavras-chaves: Iodo. Adequação. Nutrizes. Lactentes. Sal.



AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE NUTRIENTES EM GESTANTES ATENDIDAS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SÃO LUÍS, MA: ESTUDO DE BASE POPULACIONAL

Projeto de pesquisa aprovado no EDITAL 03/2022 – NUPES

Curso: Nutrição

Professora coordenadora: Wyllyane Rayana Chaves Carvalho

Alunos: Suzana Martins França (pesquisadora bolsista), Isamara Carvalho Lima, Lucas Emanuel da Silva e Ariana Santos Leão

RESUMO

Na gestação é comum alterações no comportamento alimentar, seja por variações diárias e sazonais, surgimento de morbidades, sintomas típicos do próprio ciclo vital, maus hábitos alimentares. Essas alterações impactam diretamente no resultado obstétrico, sobretudo durante o primeiro trimestre de gestação. Conhecer a ingestão de nutrientes de um público vulnerável, como o materno infantil, e que exige cuidados específicos, é de grande importância para criação de orientações e medidas na melhoria das condições nutricionais e de saúde das gestantes. Portanto, o objetivo do estudo é avaliar a ingestão de nutrientes em gestantes atendidas em Unidades Básicas de São Luís, MA. O estudo investigou uma amostra de base populacional cujas as variáveis de maior interesse (nutrientes ingeridos) foram extraídas por meio de um Questionário de Frequência do Consumo Alimentar (QFCA). Foram estimados pelo software Dietbox: a ingestão diária de energia, carboidratos, proteínas, lipídios totais, fibras, cálcio, ferro, zinco, potássio, sódio, magnésio, fósforo, vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B3, B6, B9, B12. Os dados foram analisados no STATA 14.0 por meio de estatísticas descritivas e comparados as recomendações diárias (DRIS). Acredita-se que os resultados do estudo poderão intensificar o debate sobre a importância da adequação da ingestão de nutrientes para o binômio mãe-bebê e que podem ser melhor geridas e acompanhadas nos sistemas de Saúde.

Palavras-chaves: Gestantes. Ingestão. Nutrientes. DRIS.



BIOMARCADORES HISTOLÓGICOS E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS PARA DETECÇÃO DE POTENCIAIS RISCOS À SAÚDE HUMANA UTILIZANDO UM PEIXE ESTUARINO DA COSTA AMAZÔNICA BRASILEIRA

Projeto de pesquisa aprovado no EDITAL 03/2022 – NUPES

Curso: Biomedicina

Professora coordenadora: Gustavo Henrique Rodrigues Vale de Macedo

Alunas: Samanda de Jesus Roland Pires (bolsistas de iniciação científica) e Ana Laíssa Pereira

RESUMO



CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA DA CUTÍCULA DO CARRAPATO DE BOVINOS *Rhipicephalus microplus*

Projeto de pesquisa aprovado no EDITAL 03/2022 – NUPES

Curso: Medicina veterinária


Professora coordenadora: Carolina Rocha e Silva

Alunos: Thamyres de Oliveira Alves (iniciação científica) e Larah Rameny Francisca Melo e Silva

RESUMO

A bovinocultura é uma das principais atividades econômicas no Brasil. Um dos maiores problemas enfrentados pela atividade é o parasitismo pelo carrapato *Rhipicephalus microplus*. Ele causa danos a saúde pela espoliação sanguínea e transmissão de patógenos ao animal. Nos últimos anos, cepas de carrapatos resistentes vêm sendo selecionadas. Conhecer o processo de formação da cutícula e o processo de ecdise auxilia a entender como os produtos acaricidas interferem na formação da estrutura da cutícula dos carrapatos, podendo contribuir no desenvolvimento de novas drogas. Justifica-se esse trabalho pela necessidade de se conhecer as características da cutícula do carrapato *R. microplus* durante o seu desenvolvimento, desde o período larval até a fase adulta. O objetivo geral desse trabalho é caracterizar a estrutura da cutícula de larvas de *R. microplus*. Estamos utilizando uma cepa de carrapatos mantida na Universidade Federal do Maranhão, utilizando todas as fases do parasito, de ninfa à adulto. Espécimes de cada fase estão sendo coletadas e estão sendo montadas lâminas histológicas, coradas com hematoxilina-eosina. As características histológicas da cutícula dos carrapatos serão analisadas nas diferentes fases. Os dados da cutícula dos espécimes de *R. microplus* serão analisadas pelo teste de normalidade de D'Agostino-Pearson e as médias comparadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, no software GraphPad Prism 7.0.

Palavras-chave: carrapato; histologia; resistência.



CONHECIMENTO DE GESTANTES ACERCA DO DIABETES MELITUS GESTACIONAL E A EFETIVIDADE DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PRÉ-NATAL

Projeto de pesquisa aprovado no EDITAL 03/2022 – NUPES

Curso: Enfermagem

Professora coordenadora: Eduarda Gomes Bogea

Alunos: Camila Regina Sousa Franco (bolsista de iniciação científica), Jamilly Lopes: Jamilly Andrade Lopes, Carla Beatriz

Aguiar Vieira, Jamilly Lopes: Sarah Milena Santos de Carvalho

RESUMO

O diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma intolerância à carboidratos, caracterizado pela hiperglicemia, tornando-se o distúrbio metabólico mais frequente na gestação. Objetivou-se avaliar o conhecimento de gestantes sobre o DMG e a efetividade da educação em saúde no pré-natal público de São Luís. Estudo transversal analítico quantitativo, realizado em Unidades Básicas de Saúde. Incluídas gestantes com idade entre 18 e 35 anos, com no mínimo duas consultas. Aplicou-se um questionário com 36 questões, com variáveis sociodemográficas, perfil gestacional, conhecimento do DMG, diabetes mellitus geral (DM) e efetividade da educação em saúde. O bloco do DM geral, baseou-se no Diabetes Knowledge Questionnaire DKN-A, validado por Torres et al. Os dados foram armazenados no Excel e analisados pela estatística descritiva analítica STATA 14.0. Utilizou-se o teste Chi-quadrado para avaliar as diferenças entre os níveis de conhecimento. Participaram 269 gestantes, entre 23 e 31 anos (44,76%), ensino médio completo (70,26%), pardas (60,97%), união estável (36,43%) e renda familiar de 1-3 salários-mínimos (58,74%). Dessas, 78% alegaram ter ouvido falar no DMG, mas 52,79% não sabem o que é, e 60,59% não sabem suas complicações. A média de consultas foi 5, onde 63,20% foram orientadas e 86,25% não participaram de ações de educação em saúde. Comparando as gestantes pelo nível de conhecimento, notou-se que aquelas com elevado nível tinham ensino superior completo ($p=0,001$), Casadas ($p<0,001$), 6 ou mais consultas ($p=0,001$) e foram orientadas no pré-natal ($p=0,004$). As gestantes possuem baixo nível de conhecimento sobre o DMG, evidenciando a importância da educação em saúde para que haja aumento do conhecimento sobre doenças como o DMG.



Palavras-chave: Diabetes Gestacional, Gestantes, Conhecimento.

INCIDÊNCIA DE LESÕES POR PRESSÃO EM PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA

Projeto de pesquisa aprovado no EDITAL 03/2022 – NUPES

Curso: Enfermagem

Professora coordenadora: Rosana de Jesus Santos Martins Coutinho

Alunos: João Gabriel dos Santos Carneiro

RESUMO

A incidência de lesões por pressão está amplamente relacionada a hospitalização em UTI, em razão de ser uma área arquitetada para receber pacientes de alta complexidade, portanto, propensos a desenvolver lesões relacionadas a permanência prolongada no leito. O objetivo deste estudo é avaliar a incidência e os fatores associados para o desenvolvimento de LPPs em pacientes hospitalizados em UTI. Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa com amostra por conveniência, realizado em um hospital de alta complexidade da rede estadual da cidade de São Luís do Maranhão, do qual foi realizado a coleta de dados por meio de um questionário, contendo questões sobre fatores socioeconômicos e características clínicas, além da aplicação da escala de Braden. Os dados foram armazenados no programa Excel® e as análises estatísticas no programa STATA®. Foram visitadas 5 UTIs, entre elas, coronariana, cirúrgica, cardíaca, geral I e II, onde em sua totalidade, 106 pacientes foram observados durante pesquisa. A incidência de lesões por pressão obteve 27,36% no total, sendo contabilizadas principalmente nas UTIs gerais 40,54% e cirúrgica 32,00%. A taxa de acometimento por LPP nos pacientes que participaram da pesquisa foi de 26,39% sexo masculino e 29,41% sexo feminino. De acordo com a escala de Braden, o alto risco para desenvolvimento de LPP atingiu 17,92%. As lesões por pressão não são um evento incidente nas UTIs, atingindo o total de 27,36%. Portanto, as práticas de prevenção sobre LPP devem constantemente serem aplicadas, para que assim, essa problemática assistencial não se sobressaia nos serviços de saúde.

Palavras-chave: Unidade de terapia Intensiva. Lesão por pressão. Enfermagem



PREVALÊNCIA DE PARASITOS DE CÃES E GATOS NA ILHA DE SÃO LUÍS - MA

Projeto de pesquisa aprovado no EDITAL 03/2022 – NUPES

Curso: Medicina veterinária

Professora coordenadora: Tássia Lopes do Vale

Alunos: Kawane Silva Cutrim (iniciação científica) e Larah Rameny Francisca Melo e Silva

RESUMO

Os animais podem ser reservatórios para diversos tipos de patógenos causadores de zoonoses. Esses animais incluem os pets de companhia, como os cães e os gatos. Com base em tais fatos, o estudo presente visa fazer um levantamento a respeito dos principais parasitos que possuem prevalência em cães e gatos na cidade de São Luís (MA). Foram analisadas 20 amostras de sangue em testes sorológicos (4DX, Leishmania, Feline triple), onde 40% dos 10 cães incluídos no estudo foram positivos para *Ehrlichia canis*, 20% para *Dirofilaria immitis*, 20% para *Leishmania sp.* Enquanto 30% (3/10) dos gatos foram positivos para o Vírus da imunodeficiência felina (FIV). Além disso, nos exames coproparasitológicos 30% dos 20 animais (3 cães e 3 gatos) deram positivo para presença de *Ancylostoma sp.*, um helminto (nematódeo) que parasita o intestino e possui importância zoonótica.

Palavras-chave: cão; gato; parasitos; helmintos



